


Faces Pain Scale Revised (FPS-R): Arabic

Children 4-12 years



10

Very much pain



8




6



4



2



1

No pain

الم قارص لا يحمل

لا الم

تُظهر هذه الوجوه مقدار الألم الذي قد تسببه الأشياء. هذا الوجه (أشيرُ إلى الوجه الموجود أقصى اليمين) لا يظهر أي ألم. تُظهر الوجوه المزيد والمزيد من الألم (أشيرُ إلى كل واحد من اليمين إلى اليسار) حتى تصل إلى الوجوه الموجودة أقصى اليسار والتي تظهر قدرًا كبيراً جداً من الألم.

أرشد الأطفال للإشارة إلى الوجه الذي يُبين مقدار الألم الذي تحمله الآن.

Treatment algorithm: based on WHO guidelines

Non-Pharmacological = distraction, positioning, heat, cold, skin to skin, kangaroo care, relaxation, therapeutic play, massage/touch

Non-Opioid = Acetaminophen, NSAIDs such as Ketorolac and Ibuprofen (unless contraindicated)

Mild Pain = Pain Score 1 – 3

Non Pharmacological
+ Non Opioid

Moderate Pain = Pain Score 4 – 6

Lower Dose Opioid + / - Non Pharmacological
+ Non Opioid

Severe Pain = Pain Score 7 - 10

Higher Dose Opioid + / - Non Pharmacological
+ Non Opioid

